Pasiga noir

Vass3R04s576-580

Vass3R04s576-580

Collection Vassal-Montpellier

Pasiga 3 Rhs 576-580



N° d'ordre :

Désignation : Pasiga.

Emplacement: 3 R 4 A 576-580

THE BOURGEONNEMENT

Epanoui (182) - m ven 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - seteux 186 - veloute 187 - aranéeux (188) - duveteux 189 cotonneur 190 - sans villosité pubescenta 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc (191) - faure ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entiègement bronzé ou cuivre 197 vert 108.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - metres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 -

aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotomeuses 204 - sans willowith pubescente 280) sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou onigrées 210 entièrement bronzées ou ouivrées 211 - vertes 213 - autres 213.

(Dans le cas oil la première feuille détachée est à lisété carmins, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées mere notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieur

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duvoteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente (582) sand villosité laineuse 283.

Limbe: glabre (220) - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans willosita pubescente (284) sans villosité laineuse (285.)

A limbo plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourments.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre (34) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villocité pubascente (R6) - sans villosité laineuse 287.)

Totalement - sillon partiellement.

N° d'ordre :

Désignation: Pasiga

Emplacement: 3R48.576-580.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250,

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256,

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert (265.)

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

44/27

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année: 1998

Code clone

Observateur: Lacombe

Code cépage :

Nom cépage : Pasiga

Emplacement: 3 R4 \$ 576.580

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5)- grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 / cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen (5)- vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1)- point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle 1)- point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente 1) présente 9.

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente 1)- présente 9

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 + révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faible(3)- moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7

- très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absenté 1) présente 9 oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court/3) - égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 -

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré (177 - coloré 176.

Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année: 1998

Code clone

Observateur: Lacombe

Code cépage :

Nom cépage : Pasiga

Emplacement: 3 R4 1576.580 0 K

Grappe

oiv 202 **longueur**: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5)- longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm)(5) - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9

oiv 204 compacité: très lâche(1)- lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) (5)- long (7-10cm) (7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7

oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale(2.)

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

Baie

oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue

(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.

oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5)- large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9.

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme(3)

oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie (2) elliptique 3) - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.)

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1)- uniforme 2.

oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne(5)- forte 7 - très forte 9.

oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9

oiv 229 ombilic : peu apparent(1) apparent 2.

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée D- colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée (1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse(1)- juteuse 2.

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.

oiv 236 saveur : aucune 2 goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5

oiv 236* saveur : aucune 1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5)- long

(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen(5) difficile 7 - très difficile 9

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3.

oiv 242 longueur pépins : très courts ()- courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes [l'- présentes 2

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Annee 1998

Code cépage Nom cépage Pasiga

Code clone

Observateur TL

Emplacement: 3 R4 1576.580

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire D- elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1)- côtelée 2)- striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles absentes 1)- présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 1)- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence (1) présence (1)

oiv 353 longueur entrenoeuds : ties courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (-5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7) tres grand (-17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible / faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse três faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve / très élevé 9

Vassal

Noends aplatis (1 movens (2) saillants 3

viquem: 4